

## GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

# ANGOCIN® *Bronchialtropfen*

Wirkstoff: Andornkraut-Fluidextrakt

**Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss ANGOCIN® *Bronchialtropfen* jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist ANGOCIN® *Bronchialtropfen* und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von ANGOCIN® *Bronchialtropfen* beachten?
3. Wie ist ANGOCIN® *Bronchialtropfen* einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist ANGOCIN® *Bronchialtropfen* aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### **1. WAS IST ANGOCIN® BRONCHIALTROPFEN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

#### Stoffgruppe:

ANGOCIN® *Bronchialtropfen* ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel. Der Wirkstoff ist:

- Andornkraut-Fluidextrakt

#### Anwendungsgebiete:

ANGOCIN® *Bronchialtropfen* werden traditionell angewendet zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege.

Die Wirksamkeit der Behandlung beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

### **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON ANGOCIN® BRONCHIALTROPFEN BEACHTEN?**

ANGOCIN® *Bronchialtropfen* darf **nicht** eingenommen werden:

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Andornkraut oder gegen einen der sonstigen Bestandteile von ANGOCIN® *Bronchialtropfen* sind. Die vollständige Liste der sonstigen Bestandteile finden Sie in Abschnitt 6.

**Besondere Vorsicht** bei der Einnahme von ANGOCIN® *Bronchialtropfen* ist erforderlich:

- bei der Anwendung von ANGOCIN® *Bronchialtropfen* bei Kindern unter 12 Jahren. Es liegen hierzu keine klinischen Studien mit Patienten dieser Altersgruppe vor. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

#### **Bei Einnahme von ANGOCIN® *Bronchialtropfen* mit anderen Arzneimitteln:**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

#### **Schwangerschaft und Stillzeit:**

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Nehmen Sie ANGOCIN® *Bronchialtropfen* während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein. Für ANGOCIN® *Bronchialtropfen* gibt es noch keine ausreichenden Daten über eine Verwendung während der Schwangerschaft. Es ist nicht bekannt, ob die Wirkstoffe von ANGOCIN® *Bronchialtropfen* in die Muttermilch übergehen.

#### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

#### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von ANGOCIN® *Bronchialtropfen*:**

Dieses Arzneimittel enthält 23 Vol.-% Alkohol. Pro Dosis ANGOCIN® *Bronchialtropfen* (40 Tropfen) werden 0,33 g Alkohol zugeführt.

#### **Sonstige Hinweise:**

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Ihre Beschwerden nicht besser werden oder Nebenwirkungen auftreten.

### 3. WIE IST ANGOCIN® BRONCHIALTROPFEN EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie ANGOCIN® *Bronchialtropfen* immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Erwachsene und Jugendliche über 12 Jahre: 3mal täglich je 40 Tropfen.

#### Art der Anwendung:

Nehmen Sie die Tropfen bitte mit ausreichend Flüssigkeit vor oder zu den Mahlzeiten ein.

#### Dauer der Anwendung:

Die Dauer der Anwendung von ANGOCIN® *Bronchialtropfen* ist nicht begrenzt.

#### **Wenn Sie eine größere Menge ANGOCIN® *Bronchialtropfen* eingenommen haben, als Sie sollten:**

Vergiftungen infolge einer Überdosierung sind bisher nicht bekannt geworden. Wenn Sie versehentlich einmal mehr als die empfohlene Menge eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Bei Einnahme von deutlich darüber hinausgehenden Mengen benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Ihr Arzt wird über die notwendigen Maßnahmen entscheiden.

#### **Wenn Sie die Einnahme von ANGOCIN® *Bronchialtropfen* vergessen haben:**

Wenn Sie eine Einnahme vergessen haben, nehmen Sie beim nächsten Mal nicht die doppelte Menge ein. Setzen Sie die Einnahme mit der nächsten Dosis fort, so wie von Ihrem Arzt verordnet oder in der Gebrauchsinformation beschrieben.

### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann ANGOCIN® *Bronchialtropfen* Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Patienten auftreten müssen.

#### **Mögliche Nebenwirkungen:**

Bisher sind keine Nebenwirkungen nach Anwendung von ANGOCIN® *Bronchialtropfen* bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie dies bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

### 5. WIE IST ANGOCIN® BRONCHIALTROPFEN AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

#### **Aufbewahrungsbedingungen:**

Nicht über 25 °C lagern.

Nach Anbruch ist der Inhalt der Packung innerhalb von 12 Monaten zu verbrauchen.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt, zu schützen.

### 6. WEITERE INFORMATIONEN

Was ANGOCIN® *Bronchialtropfen* enthält:

Der Wirkstoff ist:

1 ml (entsprechend 1,04 g) Fluidextrakt enthält: 1,04 g Fluidextrakt aus Andornkraut (1:0,9-1,1); Auszugsmittel: Ethanol 30 % (V/V).

1 ml Fluidextrakt entspricht ca. 24 Tropfen.

#### **Wie ANGOCIN® *Bronchialtropfen* aussieht und Inhalt der Packung:**

Originalpackung mit 50 ml (N2) Fluidextrakt.



#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

REPHA GmbH                      Tel.: 05 11 / 7 86 10-0  
Biologische Arzneimittel      Fax: 05 11 / 7 86 10-99  
Alt-Godshorn 87                Internet: www.repha.de  
30855 Langenhagen            E-Mail: info@repha.de